



Schildklierbescherming bij ¹²³I-MIBG-scan

Je kind krijgt binnenkort een ¹²³I-MIBG-scan en moet dan van tevoren een medicijn innemen om de schildklier te beschermen: kaliumjodide.



- Kaliumjodide

- Kaliumjodide

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?	Wanneer neemt je kind de medicijnen in?	Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)
Kaliumjodide is een drank of tablet die via de mond wordt ingenomen of via de maagsonde wordt gegeven.	1x per dag gedurende twee dagen, te beginnen op de dag van de MIBG-inspuiting. De kaliumjodide moet minimaal een half uur tot maximaal 2 uur vóór de MIBG-inspuiting gegeven worden.	<ul style="list-style-type: none">• Jeuk• Roodheid• Zwelling• Huiduitslag• Benauwdheid• Soms irritatie en ontsteking van de ogen, neus en mondholte (bij langdurig gebruik)

Bijzonderheden

Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de functie van de schildklier te controleren.

Speciale instructies

- Lukt het door omstandigheden niet om je kind de medicijnen van tevoren te laten innemen, meld dit dan als je voor de scan komt.
- Neem bij koorts en keelpijn contact op met je arts of verpleegkundig specialist.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.