



Schildklierbescherming bij ¹²³I-MIBG-scan

Je kind krijgt binnenkort een ¹²³I-MIBG-scan en moet dan van tevoren drie medicijnen innemen om de schildklier te beschermen: levothyroxine, thiamazol en kaliumjodide.



| Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven? | Wanneer neemt je kind de medicijnen in? | Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur) |
|--|---|---|
| <p>Levothyroxine (andere namen: Thyrax®, Euthyrox®) is een tablet die via de mond wordt ingenomen, 's ochtends op een lege maag. Je mag de tablet eventueel oplossen in een glas met 10-15 ml water of in een spuit (duurt wat langer) en dan via de sonde geven. Maak de tablet liever niet fijn, want het poeder blijft plakken.</p> <ul style="list-style-type: none">• Als je kind continu sondevoeding krijgt, de sondevoeding twee uur voor toediening van de levothyroxine stoppen.• Als je kind alleen in de nacht sondevoeding krijgt, de levothyroxine geven 6 uur nadat de sondevoeding is gestopt. | <p>1x per dag gedurende drie dagen, te beginnen op de dag vóór inspuiting MIBG.</p> | <ul style="list-style-type: none">• Hartkloppingen• Hoofdpijn• Spierzwakte en krampen (bij te hoge dosis) |

| Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven? | Wanneer neemt je kind de medicijnen in? | Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur) |
|--|---|---|
| <p>Thiamazol (andere naam: Strumazol®) is een tablet die via de mond wordt ingenomen. Je mag de tablet eventueel fijnmaken of oplossen in water en geven via een maagsonde. De bittere smaak kan eventueel gemaskeerd worden met limonade of appelmoes.</p> | <p>2x per dag gedurende drie dagen, te beginnen op de dag vóór de inspuiting MIBG.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Spierpijn • Gewrichtspijn • Huiduitslag • Lage witte bloedcellen (bij overgevoeligheid) |
| <p>Kaliumjodide is een drank die via de mond wordt ingenomen of via de maagsonde wordt gegeven.</p> | <p>1x per dag gedurende twee dagen, te beginnen op de dag van de inspuiting MIBG. Het liefst een half uur voor het toedienen van de MIBG.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Jeuk • Roodheid • Zwelling • Huiduitslag • Benauwdheid • Soms irritatie en ontsteking van de ogen, neus en mondholte (bij langdurig gebruik) |

Bijzonderheden

Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de functie van de schildklier te controleren.

Speciale instructies

- Lukt het door omstandigheden niet om je kind de medicijnen van tevoren te laten innemen, meld dit dan als je voor de scan komt.
- Neem bij koorts en keelpijn contact op met je arts of verpleegkundig specialist.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.