



# 6-Mercaptopurine

Andere namen: 6-MP, Puri-Nethol<sup>®</sup>, Xaluprine<sup>®</sup>.

## Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een tablet of een suspensie die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken
- Huidveranderingen (rode uitslag)

## Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes (5 dagen tot 6 weken na toediening)
- Ontstoken mondslijmvlies
- Leverbeschadiging

## Speciale instructies

- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft en je ziet (grote stukken van) de pil of capsule in het braaksel, geef je het geneesmiddel opnieuw. Bij twijfel overleg je met de behandelend arts.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen ziet of als je kind over jeuk klaagt.

## Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.
- Mercaptopurine kan met en zonder voedsel worden ingenomen.



**Let op: de totale dagdosering kan uit een combinatie van tabletten bestaan.**

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.