



6-Tioguanine

Andere namen: 6-TG, Lanvis.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Milde misselijkheid en braken
- Huidveranderingen (uitslag)

Bijwerkingen op langere termijn

- Zere mond en diarree door ontstoken mond- en darmslijmvlies
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes
- Leverbeschadiging

Speciale instructies

- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft en je ziet (grote stukken van) de pil of capsule in het braaksel, geef je het geneesmiddel opnieuw. Bij twijfel overleg je met de behandelend arts.
- Laat je kind de tablet(ten) voor het eten innemen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen ziet of als je kind over jeuk klaagt.

Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.
- Bescherm je kind tegen direct zonlicht door het lange mouwen en een pet of muts te laten dragen. Smeer je kind goed in met een hoge factor zonnebrandcrème met minimaal factor 30.