



Bleomycine

Andere namen: Bleo, Bleomedac.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Koorts en koude rillingen
- Overgevoeligheidsreactie (jeuk, rode huid, kortademigheid, lage bloeddruk)
- Lichte misselijkheid en braken (tot 12 uur na toediening)

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (1 tot 2 weken na toediening)
- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies (1 tot 2 weken na toediening)
- Vermoeidheid en vermindering van de eetlust (1 tot 14 dagen na toediening)

- Haarausval
- Donkere verkleuring van de huidplooien en het nagelbed
- Longbeschadiging

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen klaagt over een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je één van hiervoor genoemde overgevoeligheidsreacties bij je kind merkt.

Bijzonderheden

Er wordt regelmatig een longfoto gemaakt en/of een longfunctieonderzoek gedaan.