



Carboplatin

Andere namen: Paraplatin JM-8.

Wat is het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit, en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in 30 minuten tot 24 uur gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn

- Haaruitval
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedlichaampjes en vooral de bloedplaatjes (2 tot 4 weken na toediening).
- Nierbeschadiging
- Gehoorverlies
- Irritatie van de zenuwbanen, met als gevolg een 'doof' of tintelend gevoel in vingers en tenen.

Speciale instructies

Waarschuw de arts als er een verandering in het gehoor van uw kind optreedt en of als uw kind klaagt over oorsuizen.

Bijzonderheden

- Dit medicijn kan nierbeschadiging geven. Voor, tijdens, en na de toediening wordt bijgehouden hoeveel vocht wordt opgenomen en uitgescheiden. Regelmatig zal er bloed en urine afgenomen worden om te onderzoeken hoe de werking van de nieren is.
- Dit medicijn kan gehoorverlies veroorzaken. Regelmatig zal een gehoortest worden afgenomen ter controle.