



## **Carmustine**

Andere namen: BCNU, BiCNU.

### **Wat is het en hoe werkt het?**

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### **Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?**

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

### **Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)**

- Misselijkheid en braken (tot enkele uren na de toediening)
- Tijdens toediening pijn (brandrig gevoel) bij de plaats van toedienen
- 'Opvliegers' (rood gezicht) tijdens toediening

### **Bijwerkingen op langere termijn**

- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (3 tot 6 weken na toediening)
- Vermoeidheid
- In uitzonderlijke gevallen leverbeschadiging
- In uitzonderlijke gevallen longbeschadiging

### **Speciale instructies**

- Waarschuw je arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen klaagt over een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens de toediening gaat hoesten of kortademig wordt.

### **Bijzonderheden**

- Er wordt er regelmatig ter controle een longfoto gemaakt en/of een longfunctieonderzoek gedaan.
- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever is.