



Clofarabine

Andere namen: Evoltra.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus in twee uur gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid, braken en diarree
- Hoofdpijn
- Koorts
- Angst, rusteloosheid, prikkelbaarheid
- Blozen
- Jeukende, rode en/of schilferende huid, ook op handpalmen en voetzolen
- Duizeligheid en flauwvallen (door verlaagde bloeddruk)

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedcellen
- Verhoogde kans op infecties en bloedingen

- Zere mond, buikpijn en diarree door ontstoken mond- en darmslijmvlies
- Verminderde eetlust
- Gehoorproblemen
- Haaruitval
- Afwijkend menstruatiepatroon

Speciale instructies

- Laat je kind goed drinken tijdens het toedienen van dit medicijn.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je merkt dat je kind minder plast en als de urine donkerder wordt.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind duizelig wordt, flauwvalt en/of hoofdpijn krijgt.