



Co-Trimoxazol

Andere namen: Bactrimel®, Trimethoprim/sulfamethoxazol.

Wat is het en hoe werkt het?

Een antibioticum dat gegeven wordt om een infectie te behandelen of om een longontsteking met pneumocystis carinii te voorkomen.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een drank of een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn

- Misselijkheid, braken
- Diarree

Bijwerkingen op langere termijn

- Huiduitslag, jeuk
- Buikpijn
- Leverbeschadiging en verminderde nierfunctie

Speciale instructies

- Als je de drank door de sonde geeft, doe dit dan snel of verdun de drank met wat water om te voorkomen dat de sonde verstopt raakt.
- Laat je kind de tablet of drank tijdens of vlak na het eten innemen.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft, geef dan de tablet of het drankje opnieuw.
- Co-trimoxazol beïnvloedt de werking van MTX. Je kind mag daarom op de dag van de orale MTX geen co-trimoxazol innemen.
- Vanaf 48 uur vóór een HD-MTX-kuur tot en met ontslag mag je kind geen co-trimoxazol innemen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen bij je kind ziet of als je kind over jeuk klaagt.