



Behandeling & medicatie

Diclofenac

Andere namen: Voltaren®, Cataflam®.

Wat is het?

Een medicijn tegen koorts, pijn en ontsteking.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet die via de mond (oraal) wordt gegeven.
- Een zetpil die via de anus (rectaal) wordt gegeven.
- Een heldere vloeistof die via een infuus (intraveneus) wordt gegeven.

Bijwerkingen

- Maagklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven, vol gevoel, boeren, zuurbranden en (zeer zelden) gebrek aan eetlust
- Darmklachten: winderigheid en (zelden) diarree en verstopping
- Verhoogde leverwaarden

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je merkt dat er bloed bij de ontlasting zit of als je kind bloed overgeeft.
- Het is belangrijk dit medicijn volgens schema te geven.

Bijzonderheden

- Omdat Diclofenac wisselwerkingen kan hebben met andere medicijnen, raden we af het zelf bij de drogist te kopen.
- Als je kind Diclofenac van de apotheek krijgt, wordt altijd gecontroleerd of je kind dit veilig kan gebruiken in combinatie met andere medicijnen die het krijgt.
- Heb je vragen over een wisselwerking van Diclofenac met een medicijn, neem dan contact op met de apotheek.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.