



Doxorubicine

Andere naam: Adriamycine.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een rode vloeistof die via een ader (intraveneus) als bolusinjectie of intraveneus als infuus gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken
- Roodkleuring van de urine (1 tot 2 dagen na toediening)
- Diarree door ontstoken darmslijmvlies

Bijwerkingen op langere termijn

- Zere mond door ontstoken mondslijmvlies (5 tot 10 dagen na toediening)
- Verlaging van het aantal rode en vooral witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes (10 tot 14 dagen na toediening)

- Haaruitval
- Beschadiging van de hartspier
- Verkleuring of roodheid van de huid boven de geïnjecteerde ader of van de (eerder) bestralde huid
- Nagelveranderingen

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen klaagt over een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden

Je kind krijgt regelmatig een electrocardiogram (ECG) en/of echo van het hart om de werking van het hart te controleren.