



Etoposide

Andere namen: Vepesid, VP-16.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.
- Een capsule of een drank die via de mond (oraal) op een lege maag gegeven wordt (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken.
- Overgevoeligheidsreactie (jeuk, verstopte neus, kortademigheid, rillingen, koorts en lage bloeddruk).

Bijwerkingen op langere termijn

- Zere mond en lippen door ontstoken mondslijmvlies.
- Verlaging van het aantal witte bloedlichaampjes en de bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening).
- Haaruitval.

- Diarree door ontstoken darmslijmvlies bij orale toediening (via de mond).

Speciale instructies

- Laat je kind de capsule of drank op een lege maag innemen.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind overgevoeligheidsreacties (jeuk, verstopte neus, kortademigheid, rillingen, koorts, lage bloeddruk) heeft.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind klaagt over een brandend of pijnlijk gevoel tijdens de toediening van dit medicijn of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen van dit medicijn overgeeft, overleg dan met de verpleegkundige of de capsule of drank opnieuw gegeven moet worden.

Bijzonderheden

De bloeddruk van je kind wordt regelmatig gecontroleerd.