



Fentanyl

Andere namen: Abstral®, Actiq®, Durogesic®, Instanyl®.

Wat is het en hoe werkt het?

Een opioïde, een sterk middel tegen pijn.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een zuigtablet of een tablet die onder de tong gelegd moet worden.
- Een pleister die de werkzame stof via de huid afgeeft.
- Een neusspray die de werkzame stof snel afgeeft.
- Een heldere vloeistof die via een infuus (intraveneus) wordt gegeven.

Bijwerkingen

- Verstopping (obstipatie)
- Sufheid, slaperigheid en verminderd reactievermogen
- Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, overgeven en soms buikpijn
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Jeuk
- Benauwdheid en moeilijk ademen
- Kortdurende ademstilstand tijdens de slaap (slaap-apneu).

Speciale instructies

Als je kind in één keer stopt met fentanyl, kan het ontweningsverschijnselen krijgen, zoals misselijkheid, overgeven, diarree, angst en trillen. Daarom wordt dit medicijn langzaam afgebouwd.

Bijzonderheden

- Dit medicijn wordt vaak gecombineerd met een andere pijnstiller, bijvoorbeeld paracetamol.
- Bij doorbraakpijn (een plotseling opkomende pijn ondanks de onderhoudsmedicatie) krijgt je kind een snelwerkende pijnstiller.
- Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of een laxeermiddel te geven.