



Imatinib

Andere naam: Glivec®.

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn (tyrosinekinase-remmer) dat gericht de groei van kankercellen remt.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een tablet die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes
- Kans op infecties of bloedingen
- Hoofdpijn en duizeligheid
- Slapeloosheid
- Ontsteking van de ogen (conjunctivitis), verhoogde traanafscheiding, wazig zien
- Maagdarmklachten, diarree, verstopping, buikpijn, weinig eetlust
- Vochtophoping (meestal in de benen en rond de ogen, soms elders in het lichaam)

- Huiduitslag, jeuk, kriebelig gevoel
- Spierspasmen en -krampen, spier- en gewrichtspijn
- Vermoeidheid
- Ontstoken mondslijmvlies
- Leverafwijkingen

Speciale instructies

- Laat je kind dit medicijn vlak voor of na het eten met een groot glas water innemen om irritatie van maag en darmen te voorkomen.
- Als je het medicijn vergeten bent, geef het dan zo snel mogelijk alsnog. Doe dit niet als het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla het innemen dan over en ga verder met het gewone schema.