



## Lomustine

Andere namen: CCNU, CeCeNu.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken

### Bijwerkingen op langere termijn

- Ontstoken mondslijmvlies
- Verlaging van het aantal rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes
- Haaruitval (soms)
- Lever- en nierbeschadiging
- Longschade

### Speciale instructies

- Laat je kind de capsule bij voorkeur 2 tot 3 uur na een maaltijd innemen, vlak voor het slapen gaan.
- Laat je kind bij het innemen een hele beker vocht drinken.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft en je ziet (grote stukken van) de pil of capsule in het braaksel, geef je het geneesmiddel opnieuw. Bij twijfel overleg je met de behandelend arts.

### Bijzonderheden

- Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te onderzoeken hoe de werking van de lever en de nieren is.
- Je kind krijgt regelmatig een longonderzoek.