



Morfine

Andere namen: Oramorph®, Sendolor®.

Wat is het en hoe werkt het?

Een opioïde, een sterk middel tegen pijn.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet of drank die via de mond (oraal) wordt gegeven.
- Een zetpil die via de anus (rectaal) wordt gegeven.
- Een heldere vloeistof die via een infuus (intraveneus) wordt gegeven.

Bijwerkingen

- Buikpijn, misselijkheid en overgeven
- Verstopping (obstipatie)
- Droge mond
- Sufheid, slaperigheid, duizeligheid
- Verminderd reactie-, concentratie- en coördinatievermogen
- Moeilijk ademen
- Moeilijk kunnen plassen
- Jeuk

Speciale instructies

- Het is belangrijk dit medicijn volgens schema te geven.
- Neem contact op met je arts als de ademhaling van je kind heel langzaam en oppervlakkig wordt.

Bijzonderheden

- Morfine wordt vaak gecombineerd met een andere pijnstiller, zoals paracetamol.
- Bij doorbraakpijn (een plotseling opkomende pijn ondanks de onderhoudsmedicatie) krijgt je kind een snelwerkende pijnstiller.
- Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of een laxemiddel te geven.
- Morfine als pijnstiller is niet verslavend.