



Nivolumab

Andere naam: Opdivo®

Wat is het en hoe werkt het?

Een monokonaal antilichaam dat zich bindt aan het eiwit PD1 op afweercellen en zo de afweercellen stimuleert om kankercellen te vernietigen.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Koorts, rillingen
- Hoofdpijn, duizeligheid
- Huiduitslag, jeuk
- Hoesten, benauwdheid
- Snelle hartslag

Bijwerkingen op langere termijn

- Vermoeidheid
- Misselijkheid, overgeven, buikpijn, obstipatie, diarree, verminderde eetlust
- Verlaging van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes (7 tot 10 dagen na toediening)
- Meer kans op (luchtweg)infecties
- Spierpijn, pijn in de gewrichten
- Verminderde werking van de lever
- Afwijkingen in de elektrolyten

Bijzonderheden

Er wordt regelmatig bloed afgenomen om te kijken hoe de werking van de lever is.

Speciale instructies

- Sommige kinderen krijgen een overgevoeligheidsreactie. De verpleegkundige controleert daarom tijdens en na het toedienen regelmatig bloeddruk, puls, ademhaling en temperatuur.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je merkt dat je kind het benauwd krijgt, huiduitslag of koude rillingen heeft.