



# (PEG-)Filgrastim

Andere namen: Neupogen, Neulasta, G-CSF.

## Wat is het en hoe werkt het?

Een eiwit dat het lichaam ook zelf aanmaakt. Dit medicijn zorgt ervoor dat het beenmerg extra witte bloedcellen aanmaakt die voor de afweer tegen bacteriële infecties zorgen.

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als injectie of via een onderhuidse injectie (subcutaan) eenmaal per dag wordt gegeven.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Roodheid op de plaats van de onderhuidse injectie

## Bijwerkingen op langere termijn

- Milde tot matige spierpijn of botpijn

## Speciale instructies

- In overleg met de behandelend arts of verpleegkundig specialist mag je je kind paracetamol geven tegen de spierpijn en botpijn.

- Thuis kan de huisarts of thuiszorgverpleegkundige de subcutane injectie geven. Dit kun je, als jij en je kind dat willen, na uitleg ook zelf doen.

## Bijzonderheden

Het bloed wordt regelmatig gecontroleerd. Zodra er genoeg witte bloedcellen zijn, mag je kind stoppen met dit medicijn.