



Prednisolon

Andere namen: Di-adreson F.

Wat is het en hoe werkt het?

Een hormoon dat lijkt op een hormoon dat door het lichaam gemaakt wordt. Het is ontstekingsremmend en vermindert overgevoeligheidsreacties. In sommige gevallen kan het kankercellen doden en versterkt het de werking van bepaalde chemotherapie.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een tablet of een drank die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) of via een lumbaalpunctie/Rickumdrain in het hersenvocht (intrathecally) wordt gegeven (afhankelijk van het protocol).

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Branderig gevoel in de maag

Bijwerkingen op langere termijn

- Toename van de eetlust, gewichtstoename en het vasthouden van vocht waardoor je kind een 'vollemaansgezicht' en een dikke buik kan krijgen
- Gedragsveranderingen, rusteloosheid, irritatie, soms agressief gedrag, slapeloosheid en depressie
- Verhoogde bloeddruk
- Verhoging van de bloedsuikers en/of suiker in de urine
- Spierzwakte
- Verminderde verschijnselen bij infecties
- Acné

Speciale instructies

- De tabletten smaken bitter. Ze mogen tijdens de maaltijd worden ingenomen met water, melk, yoghurt of vla. Dit helpt ook tegen het branderige gevoel in de maag.
-



Behandeling & medicatie

- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen van dit medicijn overgeeft, overleg dan met de verpleegkundige of de tablet of drank opnieuw gegeven moet worden.
- Door het gebruik van prednisolon kunnen infecties gemaskeerd worden.

Bijzonderheden

- Bij gebruik van prednisolon de medicatie niet ineens stoppen. De prednisolon moet langzaam verminderd worden, het zogenaamde uitsluipen. De bijwerkingen verdwijnen langzaam als de prednisolon wordt uitgesloten.

Op deze kaart staan de meest voorkomende bijwerkingen en bijzonderheden van dit medicijn. Wil je een volledig overzicht, vraag dit dan aan de arts, verpleegkundige of apotheker.