



## Procarbazine

Andere naam: Natulan.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een capsule die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken (gedurende 1 tot 6 uur)
- Huidveranderingen (uitslag, jeuk)

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes (14 tot 18 dagen na toediening, gedurende 2 tot 3 weken)
- Tintelingen in vingers en tenen

### Speciale instructies

- Je kind kan de capsule het beste voor het slapen innemen.
- Laat je kind de capsule zittend of staand innemen zonder op de capsule te kauwen.
- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft en je ziet (grote stukken van) de pil of capsule in het braaksel, geef je het geneesmiddel opnieuw. Bij twijfel overleg je met de behandelend arts.
- Ben je vergeten dit medicijn te geven, dan mag je het binnen 12 uur alsnog geven. Als er meer dan 12 uur verstreken zijn, sla je de dosis over en geef je de volgende dag op het gewone tijdstip de gewone dosis.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je huidveranderingen ziet of als je kind over jeuk klaagt.