



# Rituximab

Andere namen: Mabthera®, Truxima®.

## Wat is het en hoe werkt het?

Een monokonaal antilichaam. Dit is een eiwit dat een ander uniek eiwit (antigen) herkent en zich eraan bindt (immuuntherapie).

## Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die via een ader (intraveneus) als infuus gegeven wordt.

## Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Koorts, rillingen
- Jeuk
- Huiduitslag
- Misselijkheid en braken
- Verlaging van de bloeddruk
- Benauwdheid
- Spier- of gewrichtspijn
- Huiduitslag
- Overgevoelighedsreactie

## Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte en rode bloedcellen en bloedplaatjes (7 tot 10 dagen na toediening)
- Infecties

## Bijzonderheden

- Voor het toedienen krijgt je kind medicijnen tegen pijn/koorts en om een overgevoelighedsreactie te voorkomen.
- Eventueel krijgt het ook een corticosteroid.

## Speciale instructies

- Sommige kinderen krijgen een overgevoelighedsreactie. De verpleegkundige controleert daarom tijdens en na het toedienen regelmatig bloeddruk, pols, ademhaling en temperatuur.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je merkt dat je kind het benauwd krijgt, huiduitslag of koude rillingen heeft.