



Rivaroxaban

Andere naam: Xarelto®.

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn om trombose of longembolie te voorkomen of te behandelen (anti-stolling).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een drankje of een tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.

Bijwerkingen

- Misselijkheid
- Buikpijn, diarree of verstopping
- Hoofdpijn en duizeligheid
- Vasthouden van vocht
- Koorts
- Jeuk, huiduitslag en tijdelijke blauwe plekken
- Extreme vermoeidheid en bleke huid door bloedarmoede
- Sneller blauwe plekken en bloedneuzen en verhoogde kans op bloedingen

Bijzonderheden

- Om de kans op een bloeding te voorkomen wordt dit medicijn 12 uur vóór een lumbaalpunctie of een operatie gestopt.
- Dit medicijn kan 12 tot 24 uur na de ingreep weer worden gegeven. Je hoort van de arts of verpleegkundige wanneer.

Speciale instructies

- Laat je kind dit medicijn (eventueel vermalen) met wat eten innemen.
- Je mag de drank of de (vermalen) tablet met wat water via de sonde geven. Geef daarna wat water door de sonde.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind hele grote blauwe plekken heeft, als er bloed bij de ontlasting of urine zit, als je kind bloed overgeeft of ineens erge hoofdpijn heeft.