



## Treosulfan

Andere namen: Trecondi®.

### Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum) dat wordt gegeven als voorbereiding op een allogene stamceltransplantatie.

### Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere vloeistof die intraveneus (als infuus) gegeven wordt.

### Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Misselijkheid en braken

### Bijwerkingen op langere termijn

- Verlaging van het aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes (7 tot 14 dagen na toediening)
- Droge huid
- Diarree en zere mond door ontstoken slijmvliezen
- Infecties
- Huid (luier)uitslag en jeuk

### Speciale instructies

- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

### Huidverzorging bij treosulfan

(Treosulfan wordt met name via de urine uitgescheiden.)

Huidverzorging **vanaf de start** van de treosulfan **tot 8 uur** na de laatste toediening.

- Laat je kind zich elke dag douchen of wassen vanaf 6-8 uur na start treosulfan.
- Was of douche elke ochtend en avond de huidplooiën.
- Gebruik alleen water, dus geen zeep, doucheschuim en shampoo.
- Droog de huid door voorzichtig te deppen.
- Gebruik geen deodorant, zalf, crème, lotions of olie.
- Verschoon elke dag kleding en beddengoed.

### Als je kind een luier draagt

- Verschoon de luier minstens elke twee uur vanaf de start van de treosulfan tot 8 uur na toediening. Verschoon hierna minstens elke drie uur.
- Maak de billen schoon met een lauwe, nat washandje zonder lotion of zeep.
- Gebruik geen billendoekjes of zalf.

- 
- Als de billen kapot zijn, mag je ze eventueel voor de nacht en in de vroege ochtend (tot 08.00 uur) met zalf insmeren.
  - Kijk voordat de treosulfan gegeven wordt of er nog zalf te zien is. Maak dan de billen met een washandje met water schoon.
  - **Let op:** Je mag geen zalf gebruiken als je kind ook thiotepa krijgt.