



Vinblastine

Andere naam: Vinblastinesulfaat.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

Een heldere kleurloze tot lichtgele vloeistof die via een ader (intraveneus) in 3-5 minuten gegeven wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken), met name als het medicijn buiten het bloedvat en op de huid komt
- Misselijkheid en braken
- Verlaging van het aantal witte bloedcellen met als gevolg verminderde afweer

Bijwerkingen op langere termijn

- Buikpijn, buikkrampen, verstopping (obstipatie)
- Irritatie van zenuwbanen met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderende spierkracht in de onderbenen en de handen
- Haaruitval

Speciale instructies

- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een branderig of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Let goed op de stoelgang van je kind.

Bijzonderheden

Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of je kind een laxeermiddel te geven.