



Vinorelbine

Andere namen: Navelbine, Navirel.

Wat is het en hoe werkt het?

Een celdeling-remmend medicijn (cytostaticum).

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een heldere, kleurloze tot lichtgele vloeistof die via een ader (intraveneus) in 6-8 minuten of als infuus in 20-30 minuten gegeven wordt.
- Een capsule die via de mond (oraal) ingenomen wordt.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Irritatie van de huid (brandwondachtige plekken) als het medicijn buiten het bloedvat komt
- Misselijkheid en braken

Bijwerkingen op langere termijn

- Buikpijn, buikkrampen, verstopping (obstipatie)
- Irritatie van zenuwbanen met als gevolg tintelende vingers en tenen, pijn in de kaken en verminderende spierkracht in de onderbenen en de handen
- Haaruitval
- Infecties

Speciale instructies

- Als je kind binnen 30 minuten na het innemen overgeeft en je ziet (grote stukken van) de pil of capsule in het braaksel, geef je het geneesmiddel opnieuw. Bij twijfel overleg je met de behandelend arts.
- Waarschuw de arts of verpleegkundige als je kind tijdens het toedienen last heeft van een brandend of pijnlijk gevoel of als de huid na het toedienen rood of pijnlijk wordt.
- De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een antizonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.
- Let goed op de stoelgang van je kind.

Bijzonderheden

Het kan nodig zijn de voeding van je kind aan te passen of je kind een laxeermiddel te geven.