



Voriconazol

Andere naam: Vfend.

Wat is het en hoe werkt het?

Een medicijn dat gegeven wordt om schimmelinfecties te voorkomen of te behandelen.

Hoe ziet het eruit en hoe wordt het gegeven?

- Een heldere vloeistof die via een ader als infuus in minimaal 1 uur gegeven wordt.
- Een suspensie of tablet die via de mond (oraal) wordt ingenomen.
- Geef je kind bij inname van de suspensie of tablet van 1 uur vóór tot 1 uur na inname geen (sonde) voeding. Indien dit niet haalbaar is, dan mag het tegelijk met (sonde) voeding.

Bijwerkingen op korte termijn (binnen 24 uur)

- Pijnlijke huid of ontsteking op de plaats van toediening (bij perifeer infuus)
- Huiduitslag
- Verhoogde leverenzymen

Bijwerkingen op langere termijn

- Wazig zien
- Huiduitslag
- Verhoogde leverenzymen

Speciale instructies

De huid is gevoeliger voor zonnebrand. Vermijd de zon en gebruik een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor.

Bijzonderheden

Er wordt regelmatig bloed afgenomen om de spiegel te bepalen. Je kind mag dan dit medicijn pas innemen na het bloed afnemen.